

PERFIL BIOMEDICO DE LA TRABAJADORA SEXUAL. LEBU, JULIO DE 1992 A OCTUBRE DE 1994

Cuad. Méd.-Soc., XXXV, 4, 1994/ 37-41

*Dr. Santiago Ibacache C.
Dr. John Araneda G.
Dr. José Andrés Casassus B.
Dra. Paulina González Z.*

RESUMEN

Mucho se ha hablado de la importancia del control de la prostitución dada la proliferación abrumadora de casos del virus de inmunodeficiencia humana y otras ETS, pero poco se ha estudiado el perfil biomédico y social de este grupo de tan alto riesgo epidemiológico.

Este trabajo ha pretendido definir el perfil biomédico de este grupo de mujeres en Lebu, determinando parámetros de edad, estado civil, paridad, MAC, antecedentes de ETS y hábitos tabáquicos y alcohólicos. Los resultados obtenidos nos revelan que las mujeres que trabajan con el sexo son madres solteras, en su mayoría con una paridad promedio de 2 hijos. El antecedente de ETS está presente en la mayoría de ellas, sólo un tercio se protege usando preservativo y tienen una alta ingesta de alcohol y consumo de tabaco.

Esto lleva a orientar políticas de salud mental que permitan abordar aspectos como los anteriormente estudiados que logren mejorar la calidad de vida de este grupo de mujeres.

INTRODUCCION

La existencia y problemática de la prostitución femenina es amplia y socialmente conocida. Se reconoce en este grupo humano a una entidad inherente al desarrollo de la vida en comunidades de nuestra especie. La historia reconoce su existencia desde tiempos inmemoriales y, por lo tanto, la vida moderna no es en ningún caso una excepción a esta tradición.

Las trabajadoras del sexo constituyen un ente que es objeto de rechazo social, pero a la vez de una oculta admiración. Probablemente pueda ser incluso una necesidad para una sociedad que busca su equilibrio social y mental. Es sabido que constituyen un grupo de alto riesgo si hablamos en términos de salud, específicamente, cuando nos referimos a enfermedades de transmisión sexual. Mucho se ha hablado en la última década de su importancia en la difusión de la pandemia de virus de la inmunodeficiencia humana; sin embargo es más bien poco lo que se ha

estudiado e investigado de este importante grupo epidemiológico.

El siguiente trabajo pretende caracterizar a este grupo en un nivel local conscientes de que cada comunidad debe presentar fuertes diferencias de composición y costumbres según la idiosincrasia de sus habitantes, puesto que al final estas personas reflejan, quierase o no, al grupo social en que están insertas.

OBJETIVO GENERAL

Definir el perfil biomédico de la trabajadora del sexo en la comuna de Lebu.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el promedio de edad, estado civil, paridad y método anticonceptivo (MAC) de la trabajadora sexual de Lebu.

2. Determinar el antecedente de enfermedades de transmisión sexual (ETS) de la trabajadora sexual de Lebu.

3. Analizar hábitos alcohólicos y tabáquicos del grupo estudiado.

4. Analizar el grado de uso de preservativo por las trabajadoras sexuales como método de prevención de ETS.

MATERIAL Y METODO

Se revisó la totalidad de las tarjetas de Control Sanitario dependiente del policlínico de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Hospital de Lebu. Dado que el grupo control asistente a este policlínico es variable, se consideraron datos de pacientes que presentaban a lo menos un control en el período de julio de 1992 a octubre de 1994. Se consignaron datos de edad, estado civil (soltera, casada, viuda, separada o conviviente); paridad, método anticonceptivo (MAC) (gestante, hormonal, dispositivo intrauterino, quirúrgico y barrera); resultado de Papanicolau, antecedente de haber padecido algún tipo de ETS (sífilis, condiloma, tricomonas, gonocócicas, VIH); hábitos (tabaco, ingesta alcohólica, uso preservativo). Se excluyeron en este análisis los antecedentes de edad de inicio de actividad sexual y motivación para iniciarse en la prostitución por estar incompletos en tarjetas de Control Sanitario.

RESULTADOS

Se analizaron antecedentes de 54 pacientes (100%). Las edades fluctuaron entre los 17 años y 47 años. El promedio de edad fue 27 años (Gráfico N° 1). El 79% resultó ser soltera (43 personas), seguido del grupo de casadas y separadas con 7.4% cada uno (4 personas cada uno) (Gráfico N° 2). La paridad promedio aproximada fue de 2 hijos por persona (Tabla N° 1). El 90.7% del grupo (49 casos) estaba utilizando algún MAC, y el resto (5 casos) no usaba por estar cursando un embarazo. El MAC más utilizado fue el dispositivo intrauterino con una frecuencia de 40.7% (22 casos), luego el hormonal con un 37% (20 casos), y el menos utilizado fue el de barrera con 1.9% (1 caso) (Gráfico N° 3). El antecedente de ETS estuvo presente en un 48.1% (26 casos), siendo más frecuente la sífilis con 18.5% (10 casos) y la tricomoniasis con 16.7% (9 casos) (Gráfico N° 4). Dentro de los hábitos, el 85.2% (46 casos) fumaba y su promedio fue de 8.8 cigarrillos/día (Tabla N° 2); el 74.1% (40 casos) bebía diariamente, el 5.6% (3 casos) se embriagaba diariamente; y el 20.1% (11 casos) no bebía (Tabla N° 3). Todas las pacientes tenían su examen de Papanicolau normal y 5 casos (9.3%) presentaban virus papiloma. Dentro del uso del preservativo, sólo 30.2% (17 casos) lo usan en forma habitual como medio de protección de ETS, 69.8% (37 casos) no lo usa o lo hace en forma ocasional (Tabla N° 4).

GRAFICO N° 1
Trabajadoras según edad




GRAFICO Nº 2
Trabajadoras según estado civil




GRAFICO Nº 3
Uso de método anticonceptivo




GRAFICO Nº 4
Antecedentes de E.T.S.




GRAFICO Nº 5
Trabajadoras según paridad




TABLA 1

Análisis de las trabajadoras sexuales según su paridad
Hospital de Lebu (julio 1992-octubre 1994)

Nº hijos	Nº mujeres	%
0	8	15.1
1	21	39.6
2	9	17.0
3	10	18.9
4	2	3.8
5	2	3.8
6	1	1.9
TOTAL	54	100.0

TABLA 2

Análisis de las trabajadoras sexuales según su hábito tabáquico
Hospital de Lebu (julio 1992-octubre 1994)

	Tabaco		Total
	No	Sí	
Nº mujeres	8	46	54
%	14,8	85,2	100,0

Nº Total de cigarrillos diarios: 403
x de cigarrillos diarios por mujer fumadora: 8,8

TABLA 3

Análisis de las trabajadoras sexuales según su hábito alcohólico
Hospital de Lebu (julio 1992-octubre 1994)

	Alcohol			Total
	No	Bebe a diario	Embriaguez diaria	
Nº mujeres	11	40	3	54
%	20,3	74,1	5,6	100,0

TABLA 4

Uso de preservativos en trabajadoras sexuales
Hospital de Lebu (julio 1992-octubre 1994)

Uso preservativo	Nº casos	%
Nunca	20	39,6
Ocasional	17	30,2
Siempre	17	30,2
TOTAL	51	100,0

CONCLUSIONES

Al analizar el perfil biomédico de la trabajadora sexual bajo control en el Hospital de Lebu se puede concluir que son mujeres adultas jóvenes, en el período fértil de sus vidas, solteras en su mayoría, con más de un hijo cada una. Estas dos últimas instancias asociadas condicionan o motivan, probablemente, la práctica de la prostitución como medio de subsistencia. La mayoría utiliza algún MAC, especialmente dispositivo intrauterino o anticoncepción hormonal (principalmente oral).

Es necesario destacar la presencia de mujeres embarazadas dentro del grupo estudiado, quienes ven en el ejercicio de la explotación sexual de su cuerpo un medio de ingreso económico fácil, debido a la falencia de recursos en la que quedan por el rechazo y abandono familiar que les provoca el ser embarazadas solteras.

Es considerable el alto riesgo que tiene esta población de contraer una ETS, puesto que casi la mitad de la población estudiada, tiene el antecedente de haber padecido alguna de estas enfermedades. Como era de esperar la ETS más prevalente resultó ser la sífilis, seguida de la infestación por *Trichomona*, sin embargo, es necesario recordar que la baja presencia de cervicitis gonocócica se debe a un subdiagnóstico por no contar con la

infraestructura de laboratorio que éste requiere. Este riesgo es aún mayor por el hecho de que un bajo porcentaje de mujeres utiliza el preservativo como medio de protección en forma habitual. En la población estudiada no hay casos de SIDA y sólo aparece un caso de VIH positivo.

Otro factor de grave riesgo para la salud es la alta tasa de ingesta alcohólica, dado que un 80% bebe casi diariamente, esto inducido por el hecho de que sus ingresos dependen de la cantidad de bebidas alcohólicas que logren vender dentro del local en que estén asiladas. El otro riesgo evidente es un consumo tabáquico, con un promedio que supera los 8 cigarrillos al día, cifra que está obviamente sobre la cantidad de cigarrillos/año necesarios para aumentar el riesgo de neoplasia broncopulmonar.

Quizás uno de los escasos tópicos favorables es el control mensual, en el cual se actualiza periódicamente la serología para VDRL y VIH, además del estudio citopatológico de Papanicolaou.

Introducción. La problemática de la prostitución femenina es ampliamente conocida. Es sabido que constituyen un grupo de alto riesgo epidemiológico y que con la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana este riesgo ha aumentado aún más. Sin embargo, es poco lo que se conoce en los aspectos biomédico sociales de este grupo.

Objetivos: Definir el perfil biomédico de la trabajadora sexual de Lebu, entre julio de 1992 y octubre de 1994; determinando características de edad, paridad, método anticonceptivo (MAC) utilizado, antecedente de enfermedad de transmisión sexual (ETS), hábitos y otros.

Material y método. Se revisaron las tarjetas de control sanitario de policlínico de ETS del Hospital de Lebu entre julio de 1992 y octubre de 1994, consignándose un total de 54 casos. Se analizaron antecedentes de edad, paridad, MAC, hábitos (alcohol y tabaco), ETS presentes y otros.

Resultados: Las edades fluctuaron entre 17 y 47 años, con un promedio de 27 años. 43 casos (79,6%)

eran solteras, la paridad promedio era de 2 hijos por persona; 49 casos (90.7%) utilizaba algún MAC, siendo el dispositivo intrauterino el más frecuente (40.7%). El antecedente de ETS estuvo presente en 26 casos (48.1%), siendo la sífilis la de mayor prevalencia (18.5%). Sólo 17 casos (30.2%) usan preservativo en forma habitual. El 85.2% de las mujeres fuma y el 74.1% bebe a lo menos ocasionalmente. Todas presentan Papanicolau normal.

Conclusiones: Las trabajadoras del sexo en Lebu en el período estudiado son mujeres jóvenes, solteras en su mayoría, con más de un hijo. Esta asociación

de factores probablemente condiciona con mayor fuerza el ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia. Es considerable el riesgo de contener una ETS de esta población por la alta prevalencia existente y el hecho de no usar protección en forma habitual con preservativos. El hábito tabáquico y alcohólico es preocupante en este grupo motivado por el ambiente en el cual se desenvuelven. Un aspecto favorable es el control mensual que se realiza en el hospital, el que permite actualizar la serología para sífilis, SIDA, así como el estudio de cáncer cervicouterino.